LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

RIDOMIL GOLD® MZ 68 WP

FUNGICIDA – ACILALANINA, DITIOCARBAMATO
METALAXYL-M – MANCOZEB

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"
"MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:
Ridomil Gold® MZ 68 WP *es un fungicida sistémico que es absorbido a través de las hojas, tallos y raíces con translocación acropetal. Inhibe el crecimiento micelial en el interior de la planta e impide la esporulación. Su acción primaria es la interferencia en la biosíntesis de ácidos nucleicos (D). Actúa en forma curativa debido al Metalaxil-M y en forma protectora debido a la acción del Mancozeb. Está formado por la mezcla de dos sustancias, Metalaxil-M y Mancozeb, que proporcionan protección dentro y fuera de la planta. Específico para el control de enfermedades del follaje causadas por los hongos oomicetos del orden peronosporales como:* ***Phytophthora spp.***

EQUIPO DE APLICACIÓN:
El equipo de aplicación será bomba de mochila o equipo motorizado acoplado a tractor. Las boquillas a usar son de cono hueco. Asegúrese de tener el equipo auxiliar necesario previo a la aplicación, como dosificadores o medidores de líquidos o sólidos, paletas de agitación, recipientes para la mezcla y otros. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
En un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco de agua, hasta que se forme una pasta uniforme. La misma se vierte en un tanque o mochila donde se hará una mezcla final, la cual debe estar llena al 50% de su contenido; agitar y luego completar con el agua a utilizar. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.

RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA:

CULTIVOS		ENFERMEDADES	
Melón	Cucumis melo	Mildiu velloso	Pseudoperonospora cubensis
Ejote Francés	Phaseolus spp	Mildiu velloso	Peronospora spp
Tomate Papa Chile	Lycopersicon esculentum Solanum tuberosum Capsicum sp	Tizón tardío	Phytophthora infestans

DOSIS RECOMENDADAS:
Melón, Ejote Francés: *2 – 2,5 kg/ha en un volumen de agua de 300 – 500 L/ha. (1,4 – 1,75 kg/mz en un volumen de agua de 210 – 350 L/mz.)*
Tomate, Papa, Chile: *2,5 – 3,0 kg/ha en un volumen de agua de 300 – 600 L/ha. (1,75 – 2,1 kg/mz en un volumen de agua de 210 – 420 L/mz.)*

USOS AUTORIZADOS EN BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y REPÚBLICA DOMINICANA:

CULTIVOS		ENFERMEDADES	
Melón	Cucumis melo	Mildiu velloso	Pseudoperonospora cubensis

USOS AUTORIZADOS EN BELICE:

CULTIVOS		ENFERMEDADES	
Sandía Pepino	Citrullus vulgaris Cucumis sativus	Mildiu velloso	Pseudoperonospora cubensis

USOS AUTORIZADOS EN BELICE, HONDURAS Y REPÚBLICA DOMINICANA:

CULTIVOS		ENFERMEDADES	
Tomate Papa	Lycopersicon esculentum Solanum tuberosum	Tizón tardío	Phytophthora infestans
Tabaco Hortalizas	Nicotiana tabacum	Moho azul Tizones Mildiu velloso	Peronospora tabacina Phytophthora spp Pseudoperonospora spp

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVOS		ENFERMEDADES	
Piña	Ananas comosus		Phytophthora
Melón	Cucumis melo		Phytophthora spp
Papa	Solanum tuberosum		Mildiu velloso
Tomate	Lycopersicon esculentum		Pseudoperonospora cubensis
Sandía	Citrullus vulgaris	Tizón tardío	Phytophthora infestans

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

CULTIVOS	PLAGAS QUE CONTROLA	
Piña	Ananas comosus	Phytophtora spp
Sandia Pepino Zapallo Otras cucurbitáceas	Citrullus vulgaris Cucumis sativus Cucurbita pepo	Mildiu velloso Pseudoperonospora cubensis
Melón	Cucumis melo	Mildiu velloso Pseudoperonospora cubensis
Tomate Papa	Lycopersicon esculentum Solanum tuberosum	Tizón tardío Phytophthora infestans

DOSIS RECOMENDADAS:
2 – 2,5 kg/ha en un volumen de agua de 300 – 500 L/ha. (1,4 – 1,75 kg/mz en un volumen de agua de 210 – 350 L/mz.)
Piña: *Aplique 1.5 gramos por litro de agua, utilizando de 2,000 a 4,000 litros de agua por ha.*

MOMENTO DE APLICACIÓN:
Para Melón, Sandía, Zapallo y Pepino: *Iniciar las aplicaciones con el aparecimiento de los primeros síntomas.*
Para Tomate, Papa, Chile, Tabaco, Ejote Francés y Hortalizas*: Iniciar las aplicaciones con los primeros síntomas.*
Para Piña: *Aplique tres meses después del transplante.*

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Para Melón, Sandia, Zapallo, Pepino, Tomate, Papa, Chile, Tabaco, Ejote Francés y Hortalizas: *Intervalos de 7-14 días; Hacer como máximo 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Después, usar fungicidas preventivos. Se sugiere intercalar entre aplicaciones con otro producto de diferente modo de acción, en la dosis recomendada.*
Para Piña: *Si es necesario, repetir a los 5 ó 6 meses después del transplante. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo.*

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Tomate: *10 días.* ***Chile:*** *15 días.* ***Papa:*** *7 días.* ***Cucurbitáceas y Ejote Francés:*** *14 días.* ***Tabaco:*** *21 días.* ***Piña:*** *12 a 14 días.*

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
No entre en áreas tratadas con este producto hasta transcurridas 24 horas de efectuada la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
Ridomil Gold® MZ 68 WP *no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas en este panfleto. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.*

COMPATIBILIDAD: Ridomil Gold® MZ 68 WP *es compatible con la mayoría de los fungicidas, acaricidas y nutrientes. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.*

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Ridomil Gold® MZ 68 WP *no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en envases originales, bien cerrados y debidamente etiquetados, con su correspondiente panfleto.*

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
No se conocen síntomas de intoxicación en humanos.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN:*Administre repetidamente carbón activado disuelto en grandes cantidades de agua. En caso de ingestión, realice un lavado gástrico, administre un laxante salino. No administre grasas ni aceites. Ayude a la circulación.*
POR INHALACIÓN: *Retire a la persona afectada de la zona de peligro y llévela a una habitación bien ventilada o a donde haya aire fresco y protéjala de la hipotermia.*
POR CONTACTO CON LOS OJOS: *Lávelos con abundante agua durante 15 minutos y llame inmediatamente al médico.*
POR CONTACTO CON LA PIEL: *Quítese la ropa contaminada y lave la zona expuesta con abundante agua y jabón.*

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No tiene antídoto específico. Aplique terapia sintomática. En caso de ingestión, realice un lavado gástrico, administre un laxante salino. Ayude a la circulación. No administre grasas ni aceites.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560 y 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622 460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro deToxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	2289-7150, ext. 213
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	684-3478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:
Syngenta S.A.
Carretera a Mamonal Km 6, Cartagena, Colombia
Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

IMPORTADO POR:

Guatemala:
Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel
Tel.: 2312-7000. Fax: 2312-7005

Belice:
James Brodie & Cia. Ltda.
16 Regent Street, Ciudad de Belice.
Tel.: 277-070; Fax: 275-593.

El Salvador:
TECUNSAL, S.A. de C.V.
Km 9.5 Carretera Puerto La Libertad, Antiguo Cuscatlán
La Libertad, El Salvador.
Tel. 503 2121-2000

Honduras:

Nicaragua:
Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua Nicaragua.
Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:
Syngenta, S.A.
R.U.C. 53906-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-162A	23-07-12
BELICE	0112-12	25-03-14
EL SALVADOR	AG-98-05-493	20-05-13
HONDURAS	233-117-II	25-11-11
NICARAGUA	Sy-04N-2014	27-03-14
COSTA RICA	4276	03-02-99
PANAMÁ	1057	04-09-09
REPÚBLICA DOMINICANA	1814	08-05-13

QUIÑONES v 2015 (01) 772000566

RG 07 14